

BOLETIN No 32: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ.



Fecha : del Lunes 02 de Enero al Domingo 15 de Enero del 2022



Variable Climática	Lunes 02 De Diciem	Martes 03 de Diciem	Miércoles 04 de Diciem	Jueves 05 de Diciem	Viernes 06 de Diciem	Sábado 07 de Noviem	Domingo 08 de Diciem	Lunes 09 de Diciem	Martes 10 de Diciem	Miércoles 11 de Diciem	Jueves 12 de Diciem	Viernes 13 de Diciem	Sábado 14 de Diciem	Domingo 15 de Enero
Precipitación (milímetros de lluvia) mm (milímetros)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1
Temperatura Maxima °C (Grados Celsius)	23	23	23	21	21	20	21	21	21	20	21	17	15	14
Temperatura Minima °C (Grados Celsius)	12	11	12	12	12	11	12	11	13	13	12	9	10	9

Sistema de Alerta Temprana Según Fase Fenológica de Fresa Intibucá y Yamaranguila

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		CRECIMIENTO		La yema principal comienza a crecer		-Monitoreo constante de Humedad en suelo. -Aplicacion de Productos preventivos
MIN	MAX					
3 mm	6 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		DESARROLLO VEGETATIVO	 	Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones, visibles (alrededor de 2 cm de longitud)		•Aplicacion de fungicidas en forma preventiva. •Monitoreo de plagas. •Control de humedad en el suelo.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		FLORACION		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y Primeras flores, abiertas		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de presencia de Trips en Flores.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		FORMACION DEL FRUTO (PRODUCCION)	 	Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y Los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de daños en frutos •Manejo de sanidad de Frutos
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

Roja: Amenaza alta/ pérdida del cultivo

Amarillo: Amenaza media

Verde: No hay amenaza escenario optima



Moderada



Ligera



Parcialmente Nublado



Lluvia Fuerte



Soleado