

BOLETIN No 34: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ.



Fecha : del Lunes 30 de Enero al Domingo 12 de Febrero del 2023



Variable Climática	Lunes 30 de Enero	Martes 31 de Enero	Miércoles 01 de Febrero	Jueves 02 de Febrero	Viernes 03 de Febrero	Sábado 04 de Febrero	Domingo 05 de Febrero	Lunes 06 de Febrero	Martes 07 de Febrero	Miércoles 08 de Febrero	Jueves 09 de Febrero	Viernes 10 de Febrero	Sábado 11 de Febrero	Domingo 12 de Febrero
Precipitación (milímetros de lluvia) mm (milímetros)	0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
Temperatura Maxima °C (Grados Celsius)	24	25	25	25	23	22	22	20	24	25	26	22	22	23
Temperatura Minima °C (Grados Celsius)	11	13	13	12	12	12	12	12	13	13	10	12	12	10

Sistema de Alerta Temprana Según Fase Fenológica de Fresa Intibucá y Yamaranguila


Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación MIN MAX 3 mm 6 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C	CRECIMIENTO		La yema principal comienza a crecer		-Monitoreo constante de Humedad en suelo. -Aplicacion de Funguicidas preventivos
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C	DESARROLLO VEGETATIVO		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones, visibles (alrededor de 2 cm de longitud)		•Aplicacion de fungicidas en forma preventiva. •Monitoreo de plagas. •Control de humedad en el suelo.
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C					

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		FLORACION		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y Primeras flores, abiertas		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de presencia de Trips en Flores.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		FORMACION DEL FRUTO (PRODUCCION)	 	Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y Los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de daños en frutos •Manejo de sanidad de Frutos.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 Roja: Amenaza alta/ perdida del cultivo

 Amarillo: Amenaza media

 Verde: No hay amenaza escenario optima



Moderada



Ligera



Parcialmente Nublado



Lluvia Fuerte



Soleado