

BOLETIN No 35: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ.



Fecha : del Lunes 13 de Febrero al Domingo 26 de Febrero del 2023



Variable Climática	Lunes 13 De Febrero	Martes 14 de Febrero	Miércoles 15 de Febrero	Jueves 16 de Febrero	Viernes 17 de Febrero	Sábado 18 de Febrero	Domingo 19 de Febrero	Lunes 20 de Febrero	Martes 21 de Febrero	Miércoles 22 de Febrero	Jueves 23 de Febrero	Viernes 24 de Febrero	Sábado 25 de Febrero	Domingo 26 de Febrero
Precipitación (milímetros de lluvia) mm (milímetros)	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	3.5	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Temperatura Maxima °C (Grados Celsius)	28	29	29	28	23	20	21	21	25	27	26	21	21	23
Temperatura Minima °C (Grados Celsius)	17	17	18	17	09	12	12	11	10	10	11	13	12	12

Sistema de Alerta Temprana Según Fase Fenológica de Fresa Intibucá y Yamaranguila

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		CRECIMIENTO		La yema principal comienza a crecer		-Monitoreo constante de Humedad en suelo. -Aplicacion de Funguicidas preventivos
MIN	MAX					
3 mm	6 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		DESARROLLO VEGETATIVO	 	Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones, visibles (alrededor de 2 cm de longitud)		•Aplicacion de fungicidas en forma preventiva. •Monitoreo de plagas. •Control de humedad en el suelo.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		FLORACION		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y Primeras flores, abiertas		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de presencia de Trips en Flores.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		FORMACION DEL FRUTO (PRODUCCION)	 	Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y Los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico		•Control de Humedad en suelo. •Monitoreo de plagas y enfermedades en cultivo y alrededores. •Manejo de Tejidos •Monitoreo de daños en frutos •Manejo de sanidad de Frutos.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

Roja: Amenaza alta/ pérdida del cultivo

Amarillo: Amenaza media

Verde: No hay amenaza escenario optima



Moderada



Ligera



Parcialmente Nublado



Lluvia Fuerte



Soleado