

BOLETÍN No 56: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ.



Fecha : Lunes 04 de diciembre al Domingo 17 de diciembre del 2023



Variable Climática	Lunes 04 de diciembre	Martes 05 de diciembre	Miércoles 06 de diciembre	Jueves 07 de diciembre	Viernes 08 de diciembre	Sábado 09 de diciembre	Domingo 10 de diciembre	Lunes 11 de diciembre	Martes 12 de diciembre	Miércoles 13 de diciembre	Jueves 14 de diciembre	Viernes 15 de diciembre	Sábado 16 de diciembre	Domingo 17 de diciembre
Precipitación (milímetros de lluvia) mm (milímetros)	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Temperatura Maxima °C (Grados Celsius)	21	22	21	16	16	17	16	16	15	19	19	20	21	20
Temperatura Minima °C (Grados Celsius)	15	14	14	13	14	13	15	14	14	14	13	13	13	13

Sistema de Alerta Temprana según Fase Fenológica de Fresa Intibucá y Yamaranguila

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación MIN MAX 3 mm 6 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C	CRECIMIENTO		La yema principal comienza a crecer		Manejo de humedad en el suelo, monitoreo de Plagas y enfermedades.
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C	DESARROLLO VEGETATIVO		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones, visibles (alrededor de 2 cm de longitud)		Manejo de humedad en el suelo, monitoreo de Plagas y enfermedades a nivel foliar y a nivel de suelo.
Precipitación MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura MIN MAX 14 °C 25 °C					

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación según tipo alerta
Precipitación		FLORACIÓN		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y Primeras flores, abiertas		Manejo de humedad en el suelo, monitoreo de Plagas y enfermedades. Uso de trampas para monitoreo de presencia de plagas. Monitoreo de fruta para identificar presencia de Botritis.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación		FORMACIÓN DEL FRUTO (PRODUCCIÓN)	 	Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y Los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico		
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

Roja: Amenaza alta/ pérdida del cultivo

Amarillo: Amenaza media

Verde: No hay amenaza escenario optima



Moderada



Ligera



Parcialmente Nublado



Lluvia Fuerte



Soleado