

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 72: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Fecha: Lunes 14 al Domingo 27 de abril del 2025



Variable Climática	Lunes 17 de abril	Martes 15 de abril	Miércoles 16 de abril	Jueves 17 de abril	Viernes 18 de abril	Sábado 19 de abril	Domingo 20 de abril	Lunes 21 de abril	Martes 22 de abril	Miércoles 23 de abril	Jueves 24 de abril	Viernes 25 de abril	Sábado 26 de abril	Domingo 27 de abril
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	0.0	0.1	2.5	1.8	1.5	0.0	3.0	3.0	4.3	0.0	0.6	0.6	0.7	2.3
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	26	28	27	27	27	28	28	28	29	25	25	25	25	25
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	13	17	18	14	14	14	16	16	17	14	13	14	14	14

Moderada
 Lluvia
 Parcialmente Nublado
 Nublado
 Fuerte
 Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Manejo adecuado de la humedad. - Monitoreo de plagas y enfermedades. - Uso de trampas para plagas. - Vigilar presencia de Botrytis.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo	 	Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Camellones altos y buen drenaje. - Mulch plástico o acolchado. - Fungicidas preventivos. - Ventilación adecuada. - Uso de semicubiertas.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Riego constante y ligero. - Mulch para evitar flores sucias. - Fungicidas y buena aireación. - Evitar exceso de fertilizantes. - Protección con túneles.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Riego regular sin encharcar. - Acolchado para evitar pudrición. - Fungicidas en receptáculo. - Buena ventilación. - Semicubiertas si persiste humedad.

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

■ Roja: Amenaza alta/perdida del cultivo
 ■ Amarillo: Amenaza media
 ■ Verde: No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link:

<https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpiKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>