

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 73: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Fecha: Lunes 12 al Domingo 25 de mayo del 2025



Variable Climática	Lunes 12 de mayo	Martes 13 de mayo	Miércoles 14 de mayo	Jueves 15 de mayo	Viernes 16 de mayo	Sábado 17 de mayo	Domingo 18 de mayo	Lunes 19 de mayo	Martes 20 de mayo	Miércoles 21 de mayo	Jueves 22 de mayo	Viernes 23 de mayo	Sábado 24 de mayo	Domingo 25 de mayo
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	0.8	5.2	1.0	1.6	1.0	1.0	1.0	2.2	2.2	9.1	4.8	0.7	0.7	2.3
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	18	27°	28	27	27	27	28	27	27	24	24	24	25	25
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	25	17	17	16	15	15	17	17	17	15	15	15	14	14

Moderada
 Lluvia
 Parcialmente Nublado
 Nublado
 Tormenta Eléctrica
 Tormenta Parcial
 Fuerte
 Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Mantener humedad moderada. - Vigilar plagas y enfermedades. - Usar trampas para monitoreo. - Revisar brotes por Botrytis.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo	 	Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Camellones altos y buen drenaje. - Mulch o acolchado para conservar humedad. - Fungicidas preventivos. - Ventilación adecuada. - Semicubiertas si el clima es seco y cálido.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Riego frecuente y controlado. - Mulch para proteger flores. - Fungicidas y buena aireación. - Evitar fertilizaciones fuertes. - Túneles para proteger microclima.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Riego constante sin excesos. - Acolchado para evitar fruta sucia o podrida. - Aplicar fungicidas en zona de fruto. - Mantener buena ventilación. - Cubiertas si persiste el clima seco.

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

■ Roja: Amenaza alta/perdida del cultivo ■ Amarillo: Amenaza media ■ Verde: No hay amenaza escenario

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link:
<https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6X12UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>