

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 74: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Fecha: lunes 26 de mayo al domingo 08 de junio del 2025

Variable Climática	Lunes 26 de mayo	Martes 27 de mayo	Miércoles 28 de mayo	Jueves 29 de mayo	Viernes 30 de mayo	Sábado 31 de mayo	Domingo 01 de junio	Lunes 02 de junio	Martes 03 de junio	Miércoles 04 de junio	Jueves 05 de junio	Viernes 06 de junio	Sábado 07 de junio	Domingo 08 de junio
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	0.5	0.7	2.4	1.5	1.0	1.0	1.7	2.2	7.9	2.4	22.6	18.5	0.5	0.6
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	25	28°	29	29	29	29	28	27	28	27	26	26	25	24
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	14	15	16	16	18	18	17	17	18	17	17	18	18	15

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Mantén humedad constante. - Monitorea plagas y hongos.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm	Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Riega más para compensar déficit. - Usa camellones y mulch. - Aplica fungicidas preventivos. - Mejora ventilación.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C					

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		▪ Riego ligero y frecuente. ▪ Acolchado para proteger flores. ▪ Fungicidas y controla fertilización. ▪ Usa túneles si es necesario.
MIN MAX					
142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual					
MIN MAX	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		▪ Riego regular y uniforme. ▪ Mulch para evitar pudriciones. ▪ Fungicidas en base del fruto. ▪ Buena ventilación y protección.
MIN MAX					
142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual					
MIN MAX					
14°C 25°C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente

link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>