

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 75: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Fecha: lunes 09 al domingo 22 de junio del 2025



Variable Climática	Lunes 09 de mayo	Martes 10 de mayo	Miércoles 11 de mayo	Jueves 12 de mayo	Viernes 13 de mayo	Sábado 14 de mayo	Domingo 15 de junio	Lunes 16 de junio	Martes 17 de junio	Miércoles 18 de junio	Jueves 19 de junio	Viernes 20 de junio	Sábado 21 de junio	Domingo 22 de junio
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	11.2	5.2	1.9	1.7	5.5	6.2	3.8	9.1	10.8	5.0	3.2	7.7	10.9	0.5
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	24	24	26	27	25	25	25	25	23	25	26	27	27	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	14	13	15	16	17	17	18	16	16	16	17	17	17	15

Moderada
 Lluvia
 Parcialmente Nublado
 Nublado
 Tormenta Eléctrica
 Tormenta Parcial
 Fuerte
 Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MINMAX 3 mm6 mm Temperatura promedio anual MINMAX 14 °C25 °C	Germinación		La yema principal comienza a crecer.	Alerta Roja	- Drenaje y camellones altos. - Fungicidas, ventilación y acolchado. - Mulch plástico y buena aireación. - Uso de túneles o semicubiertas.
Precipitación promedio anual MINMAX 142 mm213 mm Temperatura promedio anual MINMAX 14°C25°C	Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		Alerta Amarilla

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual		Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Fertilización complementaria. - Fungicidas y ventilación. - Acolchado para reducir estrés hídrico.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura promedio anual						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación promedio anual		Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Mulch plástico para evitar fruta sucia o podrida. - Buena aireación. - Acolchado y si persiste humedad
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura promedio anual						
MIN	MAX					
14°C	25°C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente

link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>