

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 77: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 07 de julio al domingo 20 de julio del 2025



Variable Climática	Lunes 07 de julio	Martes 08 de julio	Miércoles 09 de julio	Jueves 10 de julio	Viernes 11 de julio	Sábado 12 de julio	Domingo 13 de julio	Lunes 14 de julio	Martes 15 de julio	Miércoles 16 de julio	Jueves 17 de julio	Viernes 18 de julio	Sábado 19 de julio	Domingo 20 de julio
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	5.9	0.0	7.0	3.5	6.9	0.6	10.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	24	24	25	25	25	27	26	21	25		27	27	27	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	14	15	16	16	16	17	17	15	14	15	17	17	25	14

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación , Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Drenaje y camellones altos. - Fungicidas, ventilación y acolchado. - Mulch plástico y buena aireación. - Suspender riegos adicionales. - Mejorar drenaje y evitar encharcamiento.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C					

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Fertilización complementaria. - Mantener riegos controlados. - Fungicidas y ventilación. - Acolchado para evitar pérdidas de humedad
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Mulch plástico para evitar fruta sucia o podrida. - Buena aireación. - Acolchado y si semicubiertas si persiste humedad. - Riego suplementario.

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

● **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo ● **Amarillo:** Amenaza media ● **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente

link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>