

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 78: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ


Lunes 21 de julio al domingo 03 de agosto del 2025

Variable Climática	Lunes 07 de julio	Martes 08 de julio	Miércoles 09 de julio	Jueves 10 de julio	Viernes 11 de julio	Sábado 12 de julio	Domingo 13 de julio	Lunes 14 de julio	Martes 15 de julio	Miércoles 16 de julio	Jueves 17 de julio	Viernes 18 de julio	Sábado 19 de julio	Domingo 20 de julio
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	5.9	0.0	7.0	3.5	6.9	0.6	10.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	24	24	25	25	25	27	26	21	25		27	27	27	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	14	15	16	16	16	17	17	15	14	15	17	17	25	14

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación, Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Mantener drenaje adecuado y uso de camellones altos. - Aplicar fungicidas preventivos si hay alta humedad relativa. - Usar mulch plástico para conservar la temperatura del suelo. - Buena ventilación y aireación del cultivo.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Aplicar fertilización nitrogenada. - Realizar monitoreo constante de estolones y controlar malezas. - Continuar con monitoreo climático diario para detectar variaciones bruscas. - Mantener acolchado para evitar pérdida de humedad.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C					

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 77: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 21 de julio al domingo 03 de agosto del 2025

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		• Fertilización complementaria. • Mantener riegos controlados. • Aplicar fungicidas y ventilación adecuada. • Acolchado para evitar pérdidas de humedad.
MIN					
142 mm					
MAX					
Temperatura promedio anual	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		• Colocar Mulch plástico para evitar fruta sucia o podrida. • Aumentar frecuencia de monitoreo de plagas y enfermedades por condiciones variables. • Riego suplementario.
MIN					
142 mm					
MAX					
Temperatura promedio anual					
MIN					
14 °C					
MAX					
14 °C					
MAX					
25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>