

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 79: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 04 de agosto al domingo 17 de agosto del 2025

Variable Climática	Lunes 04 de agosto	Martes 05 de agosto	Miércoles 06 de agosto	Jueves 07 de agosto	Viernes 08 de agosto	Sábado 09 de agosto	Domingo 10 de agosto	Lunes 11 de agosto	Martes 12 de agosto	Miércoles 13 de agosto	Jueves 14 de agosto	Viernes 15 de agosto	Sábado 16 de agosto	Domingo 17 de agosto
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	5.4	12.8	4.3	6.1	1.0	0.0	1.3	0.0	5.2	13.8	0.6	0.6	0.0	0.8
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	26	24	26	27	26	26	26	27	27	26	24	24	23	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	16	17	16	17	15	15	15	17	17	17	15	15	15	15

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación, Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Revisar y asegurar el drenaje del terreno. - Aplicar fungicida preventivo al suelo. - Evitar encharcamientos con camellones altos.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Realizar poda de estolones para concentrar energía en el crecimiento foliar. - Controlar malezas con deshierbe manual o cobertura. - Suspender riegos si el suelo está saturado.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 79: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 04 de agosto al domingo 17 de agosto del 2025

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Asegurar buena ventilación entre plantas para reducir humedad relativa. - Aplicar fungicidas sistémicos. - No regar si hay pronóstico de lluvia.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Colocar mulch para evitar que el fruto toque el suelo. - Recolectar frutos maduros de inmediato. - Revisar frutas y hojas por hongos o podredumbre.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>