

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 80: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ


Lunes 18 de agosto al domingo 31 de agosto del 2025

Variable Climática	Lunes 18 de agosto	Martes 19 de agosto	Miércoles 20 de agosto	Jueves 21 de agosto	Viernes 22 de agosto	Sábado 23 de agosto	Domingo 24 de agosto	Lunes 25 de agosto	Martes 26 de agosto	Miércoles 27 de agosto	Jueves 28 de agosto	Viernes 29 de agosto	Sábado 30 de agosto	Domingo 31 de agosto
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	3.7	1.6	20.6	1.12	1.3	2.4	1.0	6.2	7.4	4.4	0.5	0.5	0.0	0.8
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	26	25	25	27	16	26	26	26	26	27	26	23	24	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	16	16	16	16	15	15	16	17	16	17	15	16	15	16

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación, Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Mantener humedad sin encharcar. - Usar acolchado. - Realizar deshierbe manual temprano.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Aplicar fertilización rica en nitrógeno. - Monitorear plagas chupadoras y masticadoras. - Podar y controlar estolones. - Garantizar riego constante pero moderado.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 80: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 18 de agosto al domingo 31 de agosto del 2025

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Proteger flores de lluvias intensas. - Fomentar polinización natural o asistida. - Monitorear enfermedades en botones florales.
MIN					
142 mm					
MAX					
Temperatura promedio anual	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Mantener riego moderado y constante. - Colocar acolchado para evitar contacto con el suelo. - Cosechar frutos maduros a tiempo. - Vigilar aparición de hongos o pudriciones.
MIN					
142 mm					
MAX					
Temperatura promedio anual					
MIN					
14 °C					
MAX					
14 °C					
MIN					
14 °C					
MAX					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>