

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

Lunes 1 de septiembre al domingo 14 de septiembre agosto del 2025

Variable Climática	Lunes 01 de agosto	Martes 02 de agosto	Miércoles 03 de Agosto	Jueves 04 de agosto	Viernes 05 de agosto	Sábado 06 de agosto	Domingo 07 de agosto	Lunes 08 de agosto	Martes 09 de agosto	Miércoles 10 de agosto	Jueves 11 de agosto	Viernes 12 de agosto	Sábado 13 de agosto	Domingo 14 de agosto
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	0.0	14.5	1.0	0.0	0.6	4.7	6.1	2.5	4.5	4.5	17.3	15.1	10.7	0.6
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	27	24	27	28	27	27	28	26	26	25	26	25	26	23
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	15	14	15	15	16	16	17	16	15	15	16	17	16	15

Moderada

Lluvia

Parcialmente Nublado

Nublado

Tormenta Eléctrica

Tormenta Parcial

Fuerte

Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

Condiciones climáticas favorables		Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación , Según tipo alerta
Precipitación promedio anual		Germinación		La yema principal comienza a crecer.		• Mantener humedad con riegos frecuentes. • Usar acolchado de paja o rastrojo. • Deshierbe manual temprano. • Cubrir semilleros con malla ligera.
MIN	MAX					
3 mm	6 mm					
Temperatura promedio anual						
MIN	MAX					
14 °C	25 °C					
Precipitación promedio anual		Desarrollo vegetativo		Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		• Riego suplementario según déficit hídrico. • Fertilizar con nitrógeno balanceado. • Podar estolones para crecimiento. • Monitorear y controlar plagas comunes.
MIN	MAX					
142 mm	213 mm					
Temperatura promedio anual						
MIN	MAX					
14°C	25°C					

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 81: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 1 de septiembre al domingo 14 de septiembre agosto del 2025

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		• Riego suplementario inmediato y priorizado. • Aplicar foliar de aminoácidos y fertilizante 20-20-20. • Monitoreo intensivo de plagas y control localizado.
MIN					
MAX					
142 mm					
Temperatura promedio anual	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		• Aplicar foliar de potasio y aminoácidos. • Mulch y aireación para reducir estrés y mantener frutos limpios. • Control fitosanitario preventivo y eliminación de plantas afectadas.
MIN					
MAX					
142 mm					
Temperatura promedio anual					
MIN					
MAX					
14 °C					
25 °C					

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>