

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 82: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

Lunes 15 de septiembre al domingo 28 de septiembre del 2025

Variable Climática	Lunes 15 de agosto	Martes 16 de agosto	Miércoles 17 de Agosto	Jueves 18 de agosto	Viernes 19 de agosto	Sábado 20 de agosto	Domingo 21 de agosto	Lunes 22 de agosto	Martes 23 de agosto	Miércoles 24 de agosto	Jueves 25 de agosto	Viernes 26 de agosto	Sábado 27 de agosto	Domingo 28 de agosto
Precipitación mm (milímetros de lluvias)	9.6	12.1	4.5	3.4	2.9	2.7	8.5	14.6	2.9	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0
Temperatura Máxima C° (Grados Celsius)	25	24	25	25	25	24	25	25	26	27	23	22	22	22
Temperatura Mínima C° (Grados Celsius)	16	16	17	16	15	15	15	16	16	17	15	16	16	15

 Moderada
  Lluvia
  Parcialmente Nublado
  Nublado
  Tormenta Eléctrica
  Tormenta Parcial
  Fuerte
  Soleado

Fuente: <https://www.accuweather.com/en/hn/intibuca/188567/weather-today/188567>

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación, Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 3 mm 6 mm	Germinación		La yema principal comienza a crecer.		- Mantener humedad sin encharcar. - Usar acolchado de paja o rastrojo. - Deshierbe manual temprano. - Cubrir semilleros con malla ligera.
Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C					
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm					
Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Desarrollo vegetativo	 	Primeras hojas emergen de la yema principal, hasta 9 o más hojas, desplegadas, así como el Comienzo de la formación de estolón: estolones visibles (alrededor de la base de la planta).		- Implementar riego suplementario por goteo o aspersión. - Aplicar fertilización balanceada en nitrógeno. - Realizar poda de estolones y concentrar energía en la planta madre. - Monitorear plagas frecuentes en sequía (pulgones y trips) y aplicar control oportuno.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo (UACC&GR)

Mesa Agroclimática Participativa de Intibucá

BOLETÍN NO. 82: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) CULTIVO FRESA INTIBUCÁ

ALERTA TEMPRANA SEGÚN FASE FENOLÓGICA DE FRESA INTIBUCÁ

Condiciones climáticas favorables	Fase fenológica	Dibujo/foto	Descripción	Tipo de alerta	Recomendación Según tipo alerta
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14 °C 25 °C	Floración		Los primeros primordios florales aparecen en la base de la roseta foliar y primeras flores, abiertas.		- Realizar riego suplementario inmediato. - Aplicar fertilización foliar con aminoácidos y 20-20-20. - Monitoreo intensivo de plagas y control localizado. - Proteger flores con coberturas ligeras.
Precipitación promedio anual MIN MAX 142 mm 213 mm Temperatura promedio anual MIN MAX 14°C 25°C	Formación del fruto (producción)		Receptáculo sobresaliendo de la corona de sépalos, Semillas, claramente visibles en el tejido del receptáculo y los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico.		- Aplicar foliar de potasio y aminoácidos. - Utilizar mulch y mejorar la aireación del suelo. - Ejecutar control fitosanitario preventivo y eliminar plantas afectadas. - Mantener riegos suplementarios frecuentes, pero de baja intensidad.

Tipo de alerta según fase fenológica de la papa en Intibucá:

 **Roja:** Amenaza alta/perdida del cultivo  **Amarillo:** Amenaza media  **Verde:** No hay amenaza escenario óptimo

Recuerde evitar los incendios forestales, miremos el siguiente video de las SAG sobre los incendios en el siguiente link: <https://drive.google.com/file/d/1eVSisdYm6XI2UKS5exqVpjKOGqKzd8Az/view?usp=sharing>